


TRAITEMENT POUR LES PATIENTS ATTEINTS D'HÉPATITE C

La trithérapie

Interféron pégylé alpha, Ribavirine

et **INCIVO®** (Télaprevir)

Avec la collaboration du **Dr. Serfaty**,
Hépatologue, Hôpital Saint Antoine, Paris



La trithérapie

Qu'est ce que la trithérapie?


Depuis plus de 10 ans, le traitement de l'hépatite C de génotype 1 reposait sur la prise de deux médicaments (bithérapie) : un antiviral et un stimulant du système immunitaire. Depuis l'arrivée des inhibiteurs de protéase, dont INCIVO®, trois médicaments sont prescrits ensemble, quand les caractéristiques du patient et ses antécédents médicaux le permettent : c'est la **trithérapie**.

Puis-je être traité par la trithérapie avec INCIVO® ?



- Cette trithérapie est indiquée dans le traitement de l'hépatite chronique due au virus C de génotype 1. Elle est prescrite chez l'adulte, y compris s'il est cirrhotique, qu'il ait déjà été traité ou non.


- Si je prends INCIVO® ça va m'apporter quoi ? Les études ont montré que l'ajout d'INCIVO® à la bithérapie augmentait clairement les chances de guérison pour le patient, qu'il ait déjà été traité ou non.



INCIVO® en pratique

- Les étapes de la trithérapie avec INCIVO® ?

La trithérapie avec INCIVO® dure les 12 premières semaines de traitement de l'hépatite C.



Il est possible que certains patients ne soient traités que six mois en fonction de leurs charge virale après 4 et 12 semaines de traitement. Il est donc important de ne pas oublier de faire des contrôles de votre charge virale à la 4^{ème} et à la 12^{ème} semaine.



Quelle posologie pour INCIVO® ?


Par voie orale, 2 comprimés de 375 mg par prise, 3 fois par jour.

● Comment optimiser l'efficacité de mon traitement par INCIVO® ?

- Prendre INCIVO® **toutes les 8 heures**.
- Avaler en entier avec un verre d'eau (ne pas mâcher ou dissoudre).
- En même temps que **de la nourriture riche en graisses**.




Respecter ces 3 règles permet d'augmenter l'efficacité du traitement.



● Et si jamais j'oublie de prendre INCIVO® ?

pour une prise habituelle à 7h



PRÉCAUTIONS INDISPENSABLES



● Où faut-il conserver le traitement ?

Il est recommandé de conserver INCIVO® et la ribavirine à **température ambiante**, dans leur **emballage d'origine** et hors de portée des enfants. L'interféron pégylé doit être conservé au **réfrigérateur** (au niveau du bac à légumes).

● Quels sont les effets secondaires et comment les gérer ?

Éruptions cutanées : les patients traités par INCIVO® peuvent développer des éruptions cutanées accompagnées de démangeaisons. Celles-ci sont généralement légères ou modérées, mais elles peuvent devenir sévères.

Signalez sans attendre la moindre éruption cutanée (bouton, rougeur, démangeaisons...) car elle pourrait s'aggraver. Mais n'arrêtez surtout pas votre traitement sans l'avis de votre médecin. Pensez aussi à vous protéger du soleil !

Fatigue, faiblesse, essoufflement, étourdissement et/ou la sensation que votre cœur s'accélère. Inconfort, irritation ou saignement au niveau de l'anus. La survenue et l'intensité de ces effets indésirables est variable selon les personnes.

● Puis-je prendre d'autres médicaments sans risques ?

Incivo® peut interagir avec de nombreux autres médicaments. Ces interactions peuvent **diminuer l'efficacité** du traitement ou **déclencher une toxicité inhabituelle**.

Avant de commencer votre trithérapie, signalez à votre médecin tout autre traitement en cours (et aussi plantes, drogues, médicaments achetés en vente libre) et consultez-le AVANT DE PRENDRE tout autre produit ! Ne prenez jamais de produits à base de millepertuis ou de jus de pamplemousse.

Personnes à contacter en cas d'urgence ou de questions :

Nom : Nom :
Fonction : Fonction :
Coordonnées : Coordonnées :

Pendant toute la durée du traitement contre l'hépatite C, il est important de se faire aider et de ne pas rester isolé.