LES TRAITEMENTS DE L' HEPATITE C

MON TRAITEMENT C'

SOS hépatites
Fédération

COMMENT PRENDRE MON TRAITEMENT CONTRE L'HÉPATITE C

Mon traitement est une combinaison de plusieurs médicaments

Plusieurs traitements sont disponibles contre le virus de l'hépatite C et d'autres vont arriver.
Les taux de réussite de ces traitements avec des molécules Antivirales à Action Directe (AAD) sont supérieurs à 90/95 % et dans certaines populations, ils atteignent 100 %.
***Votre spécialiste vous prescrira les AAD qui vous conviennent le mieux** en fonction de votre génotype, de votre stade de fibrose, en tenant compte aussi de vos spécificités (co-infections VIH/VHB, surpoids, diabète, problèmes rénaux, addictions, traitements en cours…).*

ATTENTION

Ces molécules ne sont disponibles à ce jour que dans les pharmacies hospitalières.
Renseignez-vous sur les heures d'ouverture et de délivrance
(organisez-vous si vous partez en vacances ou à l'étranger).

CO-INFECTION VIH-VHC

Il n'est pas recommandé d'arrêter le traitement antirétroviral pour introduire le traitement de l'hépatite C.
Il est recommandé **d'évaluer les interactions** entre les molécules du traitement VHC avec les antirétroviraux.
Si nécessaire, avant l'initiation du traitement VHC, le médecin référent pour le VIH modifiera votre traitement antirétroviral pour éviter les interactions médicamenteuses.
Le traitement VHC et les doses sont les mêmes que pour un mono-infecté VHC.

SOS hépatites Fédération

N° Vert 0 800 004 372
APPEL GRATUIT

MON C' TRAITEMENT

SOVALDI® + DAKLINZA® AVEC OU SANS RIBAVIRINE	4/5
SOVALDI® + OLYSIO® AVEC OU SANS RIBAVIRINE	6/7
HARVONI® AVEC OU SANS RIBAVIRINE	8/9
SOVALDI® + RIBAVIRINE	10/11
VIEKIRAX® AVEC OU SANS EXVIERA® AVEC OU SANS RIBAVIRINE	12/13
ZEPATIER® AVEC OU SANS RIBAVIRINE	14/15
EPCLUSA®	16/17
MAVIRET®	18/19
VOSEVI®	20/21
RIBAVIRINE	22
BON A SAVOIR Echec & retraitement / Co-infection VHB-VHC / Interactions	23

LES MOLÉCULES « PANGÉNOTYPIQUES »

De nouvelles molécules antivirales à action directe (AAD) sont dites pangénotypiques quand elles sont efficaces sur tous les génotypes (1,2,3,4,5,6) et cela, le plus souvent, sans nécessiter de rajouter la ribavirine.

MON TRAITEMENT

SOVALDI® + DAKLINZA® AVEC OU SANS RIBAVIRINE*

SOFOSBUVIR 400 mg DACLASTAVIR 60 mg

Ma dose par jour pendant 12 ou 24 semaines :

1 comprimé SOVALDI® + 1 comprimé DAKLINZA®
le matin ou le soir **à la même heure avec** de la nourriture.
Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli.
N'hésitez pas à programmer une alarme journalière sur votre téléphone !

Ne pas croquer ni casser en 2 les comprimés.

Si j'oublie mon comprimé SOLVADI®

à - de 18h, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à + de 18h, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

JE NE DOUBLE JAMAIS MA DOSE

Si je vomis - de 2h après la prise de mon comprimé, j'en reprends 1, sinon je prends mon comprimé à l'heure habituelle suivante.

Si j'oublie mon comprimé DAKLINZA®

à - de 20h, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à + de 20h, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

Je stocke mes comprimés à température ambiante, hors de portée des enfants.

LES INTERDITS

Le traitement **ne doit pas être pris** pendant la grossesse ou l'allaitement

Ne pas consommer pendant le traitement
PAMPLEMOUSSE & MILLEPERTUIS

Listes non exhaustives

Les effets indésirables / secondaires

FATIGUE - MAUX DE TÊTE - NAUSÉES - TROUBLES DE L'ATTENTION
EXACERBATION DES MALADIES CARDIAQUES PRÉ-EXISTANTES - INSOMNIES
SENSATIONS D'HYPER-ACTIVITÉ : D'ÊTRE « BOOSTÉ », D'AVOIR « LA PÊCHE »
IRRITABILITÉ - APPÉTIT DIMINUÉ - TROUBLES DU SOMMEIL

Les interactions médicamenteuses

Avant le début de votre traitement,
si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin
ou à votre pharmacien afin d'éviter toutes les interactions médicamenteuses.
Ne prenez aucun nouveau traitement sans l'accord du spécialiste des AAD.
Vous pouvez vérifier sur le site : **hep-druginteractions.org**

SOVALDI®

ANTIARYTHMIQUE	Amiodarone
ANALEPTIQUE	Modafinil
ANTICONVULSIVANTS	Carbamazépine, Phénytoïne, Phénobarbital, Oxcarbazépine
ANTIMYCOBACTERIENS	Rifabutine, Rifampicine, Rifapentine

DAKLINZA®

ANTICONSULSIVANTS	Phénytoïne, Carbamazépine ou Phénobarbital
ANTITUBERCULEUX	Rifampicine, Rifabutine
GLUCOCORTICOIDE SYSTEMIQUE	Dexaméthasone

MON TRAITEMENT

SOVALDI® + OLYSIO® AVEC OU SANS RIBAVIRINE*

SOFOSBUVIR 400 mg SIMEPREVIR 150 mg

Ma dose par jour pendant 12 ou 24 semaines :

1 comprimé SOVALDI® + 1 gélule OLYSIO®
le matin ou le soir **à la même heure avec** de la nourriture.
Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli.
N'hésitez pas à programmer une alarme journalière sur votre téléphone !

Ne pas croquer ni casser en 2 le comprimé ou la gélule.

Si j'oublie mon comprimé SOLVADI®

à - de 18h, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à + de 18h, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

JE NE DOUBLE JAMAIS MA DOSE

Si je vomis - de 2h après la prise de mon comprimé, j'en reprends 1, sinon je prends mon comprimé à l'heure habituelle.

Si j'oublie ma gélule OLYSIO®

à - de 12h, je prends ma gélule oubliée et je prends la suivante à l'heure prévue habituellement.

à + de 12h, je ne prends pas ma gélule oubliée et j'attends l'horaire de la prise suivante.

Je stocke mes comprimés à température ambiante, hors de portée des enfants.

LES INTERDITS



Le traitement **ne doit pas être pris** pendant la grossesse ou l'allaitement

Ne pas consommer pendant le traitement

~~PAMPLEMOUSSE~~
~~& MILLEPERTUIS~~

Listes non exhaustives

Les effets indésirables / secondaires

FATIGUE - MAUX DE TÊTE - NAUSÉES - DÉMANGEAISONS DE LA PEAU - ÉRUPTION CUTANÉE - CONSTIPATION - PRURIT
AUGMENTATION DE BILIRUBINE DANS LE SANG
SENSIBILITÉ À LA LUMIÈRE, ÉVITEZ TOUTE EXPOSITION AU SOLEIL OU AUX RAYONS U.V. ARTIFICIELS (CABINE DE BRONZAGE)

Les interactions médicamenteuses

Avant le début de votre traitement,
si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin
ou à votre pharmacien afin d'éviter toutes les interactions médicamenteuses.
Ne prenez aucun nouveau traitement sans l'accord du spécialiste des AAD.
Vous pouvez vérifier sur le site **: hep-druginteractions.org**

SOVALDI®

ANTIARYTHMIQUE	Amiodarone
ANALEPTIQUE	Modafinil
ANTICONVULSIVANTS	Carbamazépine, Phénytoïne, Phénobarbital, Oxcarbazépine
ANTIMYCOBACTERIENS	Rifabutine , Rifampicine, Rifapentine

OLYSIO®

ANTICONVULSIVANTS	Phénytoïne, Carbamazépine, Phénobarbital...
ANTITUBERCULEUX	Rifampicine, Rifabutine
GLUCOCORTICOIDE SYSTEMIQUE	Dexaméthasone
ANTIFONGIQUES	Azolés, Luconazole
ANTIBIOTIQUES DE LA CLASSE DES MACROLIDES	Erythromycine, Clarithromycine, Télithromycine
IMMUNOSUPPRESSEUR	Ciclosporine

MON TRAITEMENT

HARVONI® AVEC OU SANS RIBAVIRINE*

SOFOSBUVIR 400 mg
+ LEDIPASVIR 90 mg

Ma dose par jour pendant 8, 12 ou 24 semaines :

1 comprimé HARVONI®
le matin ou le soir **à la même heure** avec ou sans de la nourriture.
Choisissez le moment qui évitera les risques *d'oubli.*
N'hésitez pas à programmer une alarme journalière sur votre téléphone !

Ne pas croquer ni casser en 2 le comprimé.

Si j'oublie mon comprimé HARVONI®

à - de 18h, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à + de 18h, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

JE NE DOUBLE JAMAIS MA DOSE

Si je vomis - de 5h après la prise de mon comprimé, j'en reprends 1, sinon je prends mon comprimé à l'heure habituelle.

Si je vomis + de 5h après la prise de mon comprimé, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

CONSEIL D'HÉPATANT :
Choisissez de prendre votre comprimé le soir.

Je stocke mes comprimés à température ambiante, hors de portée des enfants.

LES INTERDITS

Le traitement **ne doit pas être pris** pendant la grossesse ou l'allaitement

Ne pas consommer pendant le traitement
~~PAMPLEMOUSSE~~
~~& MILLEPERTUIS~~

Listes non exhaustives

Les effets indésirables / secondaires

MAUX DE TÊTE - FATIGUE - NAUSÉES - IRRITABILITÉ - TOUX - PRURIT - MUSCLES DOULOUREUX - MAL AU DOS ET AUX ARTICULATIONS
EN CAS DE FATIGUE APRES LA PRISE : NE PAS CONDUIRE ET NE PAS UTILISER DE MACHINES
EN CAS D'ANTÉCÉDENTS CARDIAQUES : SURVEILLER LA TENSION ET LE RYTHME CARDIAQUE
INSOMNIES - SENSATIONS D'HYPER-ACTIVITÉ, D'ÊTRE « BOOSTÉ », D'AVOIR « LA PÊCHE »

Les interactions médicamenteuses

Si vous prenez un antiacide,
prenez-le au moins 4h avant ou au moins 4h après HARVONI®
Si vous prenez un inhibiteur de la pompe à protons,
prenez-le au même moment qu'HARVONI®. Ne le prenez pas avant HARVONI®

Avant le début de votre traitement,
si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin
ou à votre pharmacien afin d'éviter toutes les interactions médicamenteuses.
Ne prenez aucun nouveau traitement sans l'accord du spécialiste des AAD.
Vous pouvez vérifier sur le site : **hep-druginteractions.org**

HARVONI®

ANTIARYTHMIQUE	Amiodarone
ANALEPTIQUE	Modafinil
ANTICONVULSIVANTS	Carbamazépine, Phénytoïne, Phénobarbital, Oxcarbazépine
ANTIMYCOBACTERIENS	Rifabutine, Rifampicine, Rifapentine

MON TRAITEMENT

SOVALDI® + RIBAVIRINE*

SOFOSBUVIR 400 mg 200 mg ou 400 mg

Ma dose par jour pendant 12 ou 24 semaines :

1 comprimé SOVALDI® en 1 prise (le matin OU le soir)
+ RIBAVIRINE* selon posologie :
au minimum 800 mg ou au maximum 1200 mg
en 2 prises (le matin ET le soir)
à la même heure avec de la nourriture.

Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli.
N'hésitez pas à programmer une alarme journalière sur votre téléphone !

Ne pas croquer ni casser en 2 les comprimés.

Si j'oublie mon comprimé SOVALDI®

à - de 18h, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à + de 18h, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

JE NE DOUBLE JAMAIS MA DOSE

Si je vomis - de 2h après la prise de mon comprimé, j'en reprends 1, sinon je prends mon comprimé à l'heure habituelle.

Si je vomis + de 2h après la prise de mon comprimé, je n'en reprends pas et j'attends l'horaire de la prise suivante.

Je stocke mes comprimés à température ambiante, hors de portée des enfants.

LES INTERDITS

Le traitement **ne doit pas être pris** pendant la grossesse ou l'allaitement

Ne pas consommer pendant le traitement

PAMPLEMOUSSE & MILLEPERTUIS

Listes non exhaustives

Les effets indésirables / secondaires

FATIGUE - MAUX DE TÊTE - NAUSÉES
TENSION : À SURVEILLER QUAND PROBLÈMES CARDIAQUES
DOULEURS ABDOMINALES - INSOMNIES
SENSATIONS D'HYPER-ACTIVITÉ, D'ÊTRE « BOOSTÉ », D'AVOIR « LA PÊCHE »
ANÉMIE

Les interactions médicamenteuses

Avant le début de votre traitement,
si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin
ou à votre pharmacien afin d'éviter toutes interactions médicamenteuses.
Ne prenez aucun nouveau traitement sans l'accord du spécialiste des AAD.
Vous pouvez vérifier sur le site : **hep-druginteractions.org**

SOVALDI®

ANTIARYTHMIQUE	Amodiarone
ANALEPTIQUE	Modafinil
ANTICONVULSIVANTS	Carbamazépine, Phénytoïne, Phénobarbital, Oxcarbazépine
ANTIMYCOBACTERIENS	Rifabutine, Rifampicine, Rifapentine

SOS hépatites Fédération
N° Vert 0 800 004 372 APPEL GRATUIT

MON TRAITEMENT

VIEKIRAX® AVEC OU SANS EXVIERA® AVEC OU SANS RIBAVIRINE*

OMBITASVIR 12,5 mg
+ RITONAVIR 50 mg
+ PARITAPREVIR 75 mg

DASABUVIR 250 mg

Ma dose par jour pendant 12 ou 24 semaines :

2 comprimés VIEKIRAX® en une fois (le matin OU le soir)
AVEC ou SANS
1 comprimé EXVIERA® le matin ET 1 comprimé le soir
à la même heure avec de la nourriture.
Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli.
N'hésitez pas à programmer une alarme journalière sur votre téléphone !

Ne pas croquer ni casser en 2 les comprimés.

Si j'oublie mes comprimés VIEKIRAX®
à - de 12h, je prends mes comprimés oubliés et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.
à + de 12h, je ne prends pas mes comprimés oubliés et j'attends l'horaire de la prise suivante.

JE NE DOUBLE JAMAIS MA DOSE

Si j'oublie mon comprimé EXVIERA®
à - de 6h, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.
à + de 6h, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

Je stocke mes comprimés à température ambiante, hors de portée des enfants.

LES INTERDITS

Le traitement **ne doit pas être pris** pendant la grossesse ou l'allaitement

Ne pas consommer pendant le traitement

~~PAMPLEMOUSSE~~
~~& MILLEPERTUIS~~

Listes non exhaustives

Les effets indésirables / secondaires

TRÈS GRANDE FATIGUE - NAUSÉES - TROUBLES DU SOMMEIL - DÉMANGEAISONS PRURIT
EN CAS DE FATIGUE APRES LA PRISE : NE PAS CONDUIRE ET NE PAS UTILISER DE MACHINES

Lorsque vous prenez VIEKIRAX® avec ou sans EXVIERA®,
informez votre médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants :
- vous avez des nausées (mal au cœur), des vomissements ou une perte d'appétit ;
- vous remarquez un jaunissement de votre peau ou du blanc de l'œil ;
- vos urines sont plus foncées que d'habitude.

Les contre-indications

VIEKIRAX®/EXVIERA® sont contre-indiqués
pour le traitement des cirrhoses décompensées **: F4 CHILD B & C**

Les interactions médicamenteuses

Avant le début de votre traitement,
si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin
ou à votre pharmacien afin d'éviter toutes les interactions médicamenteuses.
Ne prenez aucun nouveau traitement sans l'accord du spécialiste des AAD.
Vous pouvez vérifier sur le site : **hep-druginteractions.org**

VIEKIRAX® & EXVIERA®

ANTIARYTHMIQUE	Amiodarone
STATINE	Rosuvastine
ANTIGOUTTE	Colchicine
CONTRACEPTIFS	Contenant de l'Éthinylestradiol

SOS hépatites Fédération
N° Vert 0 800 004 372 APPEL GRATUIT

MON TRAITEMENT

ZEPATIER® AVEC OU SANS RIBAVIRINE*

GRAZOPREVIR 100 mg
+ ELBASVIR 50 mg

Ma dose par jour pendant 12 ou 16 semaines :

1 comprimé ZEPATIER®
le matin ou le soir **à la même heure** avec ou sans nourriture.
Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli.
N'hésitez pas à programmer une alarme journalière sur votre téléphone !

Ne pas croquer ni casser en 2 le comprimé.

Si j'oublie mon comprimé ZEPATIER®

à - de 16h, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à + de 16h, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

JE NE DOUBLE JAMAIS MA DOSE

Si je vomis - de 4h après la prise de mon comprimé, j'en reprends 1 jusqu'à 8h avant la prise de la dose suivante, sinon je prends mon comprimé à l'heure habituelle.

Si je vomis + de 4h après la prise de mon comprimé, aucune autre dose n'est nécessaire.

Je stocke mes comprimés à température ambiante, hors de portée des enfants.

LES INTERDITS

Le traitement **ne doit pas être pris** pendant la grossesse ou l'allaitement

Ne pas consommer pendant le traitement
~~PAMPLEMOUSSE~~
& MILLEPERTUIS

Listes non exhaustives

Les effets indésirables / secondaires

FATIGUE - MAUX DE TÊTE - NAUSÉES - DIARRHÉE - INSOMNIES
A NOTER : UNE ÉLÉVATION DES TRANSAMINASES : ASAT & ALAT

Les interactions médicamenteuses

- Aucune interaction avec les traitements de substitution (Buprénorphine, Naloxone, Méthadone)
- Recommandé pour les insuffisants rénaux et dialysés génotype 1&4

Avant le début de votre traitement,
si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin
ou à votre pharmacien afin d'éviter toutes les interactions médicamenteuses.
Ne prenez aucun nouveau traitement sans l'accord du spécialiste des AAD.
Vous pouvez vérifier sur le site : **hep-druginteractions.org**

ZEPATIER®

ANTIMYCOBACTÉRIEN	Rifampine
ANTICONVULSIVANTS	Phénytoïne, Carbamazébine
ANTIFONGIQUE	Kétoconazole
ANTICOAGULANT	Dabigatran étexilate
IMMUNOSUPPRESSEUR	Ciclosporine
ANTAGONISTE ENDOTHELINE	Bosentan

MON TRAITEMENT

EPCLUSA® AVEC OU SANS RIBAVIRINE*

SOFOSBUVIR 400 mg
+ VELPATASVIR 100 mg

PANGENOTYPIQUE

Ma dose par jour pendant 12 semaines :

1 comprimé EPCLUSA®
une fois par jour, **toujours à la même heure** avec ou sans nourriture.
Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli.
N'hésitez pas à programmer une alarme journalière sur votre téléphone !

Ne pas croquer ni casser en 2 le comprimé.

Si j'oublie mon comprimé EPCLUSA®

à - de 18h, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à + de 18h, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

JE NE DOUBLE JAMAIS MA DOSE

Si je vomis - de 3h après la prise de mon comprimé, j'en reprends 1 avant la prise de la dose suivante.

Si je vomis + de 3h après la prise de mon comprimé, aucune autre dose n'est nécessaire.

Je stocke mes comprimés à température ambiante, hors de portée des enfants.

LES INTERDITS

Le traitement **ne doit pas être pris** pendant la grossesse ou l'allaitement

Ne pas consommer pendant le traitement
~~PAMPLEMOUSSE~~
~~& MILLEPERTUIS~~

Listes non exhaustives

Les effets indésirables / secondaires

FATIGUE - MAUX DE TÊTE - NAUSÉES - VERTIGE - DIARRHÉE
TROUBLES DU SOMMEIL - TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX
TROUBLES DE L'APPÉTIT - TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES

Les interactions médicamenteuses

Si vous prenez un inhibiteur de la pompe à protons,
prenez EPCLUSA® avec de la nourriture 4h avant la prise de l'inhibiteur.

Avant le début de votre traitement,
si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin
ou à votre pharmacien afin d'éviter toutes les interactions médicamenteuses.
Ne prenez aucun nouveau traitement sans l'accord du spécialiste des AAD.
Vous pouvez vérifier sur le site : **hep-druginteractions.org**

EPCLUSA®

ANTIARYTHMIQUE	Amiodarone
ANALEPTIQUE	Modafinil
ANTICONVULSIVANTS	Carbamazépine, Phénytoïne, Phénobarbital, Oxcarbazépine
ANTIMYCOBACTERIENS	Rifabutine, Rifampine, Rifapentine
PROBLÈMES CARDIAQUES	Digoxine

MON TRAITEMENT

MAVIRET®

GLECAPREVIR 100 mg
+ PIBRENTASVIR 40 mg

PANGENOTYPIQUE

DISPONIBLE EN 2018

Ma dose par jour pendant 8, 12 ou 16 semaines :

3 comprimés MAVIRET®
une fois par jour, **à la même heure avec** de la nourriture.
Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli.
N'hésitez pas à programmer une alarme journalière sur votre téléphone !

Ne pas croquer ni casser en 2 les comprimés

Si j'oublie mes comprimés MAVIRET®

à - de 18h, je prends mes comprimés oubliés et je prends les suivants à l'heure prévue habituellement.

à + de 18h, je ne prends pas mes comprimés oubliés et j'attends l'horaire de la prise suivante.

JE NE DOUBLE JAMAIS MA DOSE

Si je vomis - de 3h après la prise des 3 comprimés, je les reprends.
Si je vomis + de 3h après la prise des 3 comprimés, je n'en reprends pas.

Je stocke mes comprimés à température ambiante, hors de portée des enfants.

LES INTERDITS

Le traitement **ne doit pas être pris** pendant la grossesse ou l'allaitement

Ne pas consommer pendant le traitement
PAMPLEMOUSSE & MILLEPERTUIS

Listes non exhaustives

Les effets indésirables / secondaires

MAUX DE TÊTE - FATIGUE - NAUSÉES - DIARRHÉE - PRURIT - SE SENTIR FAIBLE, MANQUE D'ÉNERGIE

Les contre-indications

MAVIRET® est contre-indiqué avec :

- **les CONTRACEPTIFS** contenant de l'Éthinylestradiol (pilules contraceptives et anneaux vaginaux),

L'administration concomitante de MAVIRET® avec des produits contenant de l'Éthinylestradiol est contre-indiquée en raison du risque d'élévation du taux d'ALAT.

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire avec le Lévonorgestrel, la Noréthistérone, ou le Norgestimate utilisés comme contraceptifs progestatifs.

- **l'ANTICOAGULANT** : Dabigatran étexilate
- **les HYPOLIPÉMIANTS** : Atorvastatine, Simvastatine
- **l'ANTIMYCOBACTÉRIEN** : Rifampine
- **l'ANTIRETROVIRAL** : Atazanavir

Les interactions médicamenteuses

Avant le début de votre traitement,
si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin.
Vous pouvez vérifier sur le site : **hep-druginteractions.org**

MAVIRET®	
HYPOLIPÉMIANTS	Fluvastatine, Lovastatine, Pitavastatine, Pravastatine, Rosuvastatine
PROBLÈMES CARDIAQUES	Digoxine
INHIBITEUR DE LA POMPE À PROTONS	Omeprazole
ANTICOAGULANT	Warfarine
IMMUNOSUPPRESSEURS	Ciclosporine,Tacrolimus

SOS hépatites Fédération

N° Vert 0 800 004 372 APPEL GRATUIT

MON TRAITEMENT

VOSEVI®

PANGÉNOTYPIQUE

SOFOSBUVIR 400 mg
+ VELPATASVIR 100 mg
+ VOXILAPREVIR 100 mg

DISPONIBLE EN 2018

Ma dose par jour pendant 8 ou 12 semaines :

1 comprimé VOSEVI®
une fois par jour, **à la même heure avec** de la nourriture.
Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli.
N'hésitez pas à programmer une alarme journalière sur votre téléphone !

Ne pas croquer ni casser en 2 le comprimé.

Si j'oublie mon comprimé VOSEVI®

à - de 18h, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à + de 18h, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

JE NE DOUBLE JAMAIS MA DOSE

Si je vomis - de 4h après la prise de mon comprimé, j'en reprends 1 avant la prise de la dose suivante.

Si je vomis + de 4h après la prise de mon comprimé, aucune autre dose n'est nécessaire.

Je stocke mes comprimés à température ambiante, hors de portée des enfants.

LES INTERDITS



Le traitement **ne doit pas être pris** pendant la grossesse ou l'allaitement

Ne pas consommer pendant le traitement

PAMPLEMOUSSE & MILLEPERTUIS

Listes non exhaustives

Les effets indésirables / secondaires

MAUX DE TÊTE - FATIGUE - NAUSÉES - DIARRHÉE - PERTE D'APPÉTIT
TROUBLES DU SOMMEIL - INSOMNIES - MOINS D'ÉNERGIE OU DE FORCE
MYALGIE (DOULEUR MUSCULAIRE)
AUGMENTATION DE LA BILIRUBINE PENDANT LE TRAITEMENT CHEZ LES CIRRHOTIQUES. RETOUR À LA NORME APRÈS TRAITEMENT

Les contre-indications

VOSEVI® est contre -indiqué avec :

- **les CONTRACEPTIFS** contenant de l'Éthinylestradiol (pilules contraceptives)
- **l'ANTICOAGULANT** : Diabigatran étexilate
- **les ANTIMYCOBACTÉRIENS** : Rifampicine, Rifabutine, Rifapentine
- **l'ANXIOLYTIQUE/ANTICONVULSIVANT** : Phénobarbital
- **les ANTICONVULSIVANTS** : Carbamazepine, Phénytoïne
- **l'HYPOLIPÉMIANT** : Rosuvastatine

Les interactions médicamenteuses

Les antiacides doivent être pris à 4h de distance de VOSEVI® (avant ou après).
Avant le début de votre traitement,
si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin.
Vous pouvez vérifier sur le site : **hep-druginteractions.org**

VOSEVI®	
ANTIARYTHMIQUE	Amiodarone
HYPOLIPÉMIANTS	Atorvastatine, Lovastatine, Fluvastatine, Pravastatine, Simvastatine
IMMUNOSUPPRESSEUR	Ciclosporine
ANTIHISTAMINIQUES H2 (problèmes gastriques)	Nizatidine, Famotidine, Cimetidine, Ranitidine
ANTITUBERCULEUX	Rifabutine, Rifapentine
ANTICOAGULANTS	Edoxaban, Warfarine & autres médicaments antagonistes de la vitamine K
PROBLÈMES CARDIAQUES	Digoxine

COPEGUS® ou REBETOL® ou RIBAVIRINE

Dans certains cas, l'ajout de la RIBAVIRINE permet d'améliorer l'efficacité du traitement et donc du nombre de guérisons.
Cela peut permettre aussi un traitement en 12 semaines au lieu de 24.

2 dosages existent :
Comprimé ou gélule de 200 mg ou de 400 mg.
Votre médecin vous indiquera la dose à prendre, celle du matin et celle du soir.

La RIBAVIRINE :
doit être prise le matin **ET** le soir **avec** de la nourriture «grasse» (tartine beurrée ou croissant ou yaourt par ex. au petit déjeuner).
Ne pas croquer ni casser en 2 les comprimés ou les gélules.

Liste non exhaustive

Les effets indésirables / secondaires

ANÉMIE LIÉE À LA DESTRUCTION DES GLOBULES ROUGES (HÉMOLYSE) QUI PEUT ENTRAÎNER UN MANQUE D'APPÉTIT, UNE GROSSE FATIGUE, DES PALPITATIONS, MAUX DE TÊTE, TOUX ET ESSOUFFLEMENT.
GOÛT «DE FERRAILLE» APRÈS INGESTION.
RIBAVIRINE CONTRE-INDIQUÉE QUAND INSUFFISANCE RÉNALE SÉVÈRE.

La grossesse est formellement contre-indiquée pendant le traitement :
risques de malformation importants.
Pour concevoir un enfant après le traitement, la femme attendra 4 mois et l'homme 7 mois.
Si l'homme commence un traitement alors que sa femme est enceinte, **préservatif obligatoire** pour empêcher le fœtus d'être en contact avec la ribavirine présente dans le sperme.

Echec 1er traitement & retraitement

Les personnes en échec d'un 1er traitement par antiviral à action directe (AAD) ont maintenant plusieurs autres médicaments à disposition notamment les molécules « pangénotypiques ».
Leur dossier sera discuté lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) afin de leur proposer un nouveau traitement adapté à leur cas.

Réactivation du virus de l'hépatite B

Un dépistage du VHB doit être réalisé chez tous les patients avant l'initiation du traitement. Les patients co-infectés par le VHB et le VHC sont exposés à un risque de réactivation du VHB pendant ou après un traitement par des agents antiviraux à action directe et doivent par conséquent être surveillés et pris en charge conformément aux recommandations cliniques en vigueur.

Interactions médicamenteuses

Lors de votre consultation, précisez bien à votre hépatologue ou pharmacien **TOUS** les médicaments, plantes, traitement alternatif ou de phytothérapie que vous prenez.
Certaines associations de médicaments peuvent être dangereuses ; baisser l'efficacité du traitement; provoquer des effets indésirables.
La liste des interactions est trop longue pour que nous puissions l'inclure dans ce livret.
N'hésitez pas à nous contacter pour signaler tout effet secondaire
contact@soshepatites.org ou directement,
sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament.
ansm.sante.fr

UN TRAITEMENT POUR TOUS,
UNE GUÉRISON POUR CHACUN ET
UNE PROTECTION UNIVERSELLE !

L'association SOS hépatites Fédération groupe des associations ayant pour but la prévention, l'information, la solidarité, la défense de toutes les personnes concernées par les hépatites virales et les maladies du foie.

SOS hépatites Fédération
14 rue de la Beaune
93100 Montreuil
www.soshepatites.org

Association SOS hépatites Fédération

@SOSHepatites

Conception graphique : Dominique Andrieux/Fresque de Nicolas Laoutec/Rédaction : bénévole/Relecture : Comité médical

SOS hépatites Fédération

N° Vert 0 800 004 372
APPEL GRATUIT

Rédigé en toute indépendance éditoriale

V 3