


LES ÉTAPES DU PARCOURS PATIENT POUR LA STÉATOHÉPATITE MÉTABOLIQUE



1. PRISE EN CHARGE EN MÉDECINE GÉNÉRALE



1.

IDENTIFIER LES PATIENTS À RISQUE

Patients atteints de :



Syndrome métabolique



Diabète de type 2



Obésité

2.

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES



► Vérifier la
consommation
d'alcool et les
autres maladies hépatiques
possibles (hep B ou C, etc)



Bilan biologique :

- Transaminases (ASAT/ALAT)
- Bilirubine
- Plaquettes
- Taux de prothombine
- Phosphatases alcalines
- Gamma GT



Échographie

3.

CALCUL DU FIB-4 DU PATIENT

Calcul du FIB-4 en prenant
en compte :

<http://medicalcalcul.free.fr/fib4.html>



L'âge



Le taux
de plaquettes



Le Taux des
transaminases

4.

LECTURE DU FIB-4



Si FIB-4 < 1,3 :

Faible risque de fibrose
hépatique avancée

Refaire le test dans 1 à 3 ans

Si FIB-4 ≥ 1,3 :

Faire pratiquer une élastométrie

- Si élastométrie < 8 kPa : refaire le FIB-4 dans 1 à 3 ans
- Si élastométrie ≥ 8 kPa : risque élevé de fibrose hépatique avancée : consultation chez l'hépatologue