

LES MODES DE TRANSMISSION DES VIRUS DES HÉPATITES

		VIRUS DE L'HÉPATITE A	VIRUS DE L'HÉPATITE B	VIRUS DE L'HÉPATITE C	VIRUS DE L'HÉPATITE D	VIRUS DE L'HÉPATITE E
Vaccins (pour éviter la contamination)		Vaccin	Vaccin	Pas de vaccin	Vaccin hépatite B	Pas de vaccin
Alimentation (eau et aliments consommés crus contaminés par matières fécales - conditions sanitaires et d'hygiène, accès à l'eau potable, assainissement très insuffisants)		● Si contact selles	○	○	○	● Si contact selles, viande peu cuite*
Toilettes		● Si bonne hygiène des mains	○	○	○	● Si bonne hygiène des mains
Contacts humains (toucher)		○ Si bonne hygiène des mains	○	○	○	○ Si bonne hygiène des mains
Baiser profond **		○	● Si échange sang	○	Non documenté	○
Relations sexuelles et échanges de fluides non protégés		● Si contact selles	●	● Si échange sang	●	● Si contact selles
Grossesse		○ Risque de fausse couche au premier trimestre	● 90% si enfant non traité ○ Si enfant traité à la naissance	● 3 à 5% de risque de transmission à l'enfant ○ Depuis 1992	● 90% si enfant non traité ○ Si enfant traité à la naissance	○ Risque d'hépatite fulminante + ou - selon le pays
Transfusion		●	● Avant 1971 ○ Depuis 1971	● Avant 1992 ○ Depuis 1992	● Avant 1971 ○ Depuis 1971	●
Tatouage, piercing, scarification (non utilisation de matériel à usage unique et ou stérile)		○	●	●	●	○
Partage d'objets de toilette (brosse à dents, rasoir, coupe ongles)		●	●	●	●	●
Partage de matériel d'injection et de sniff entre usagers de drogues		●	●	●	●	●

* à base de foie cru de porc (saucisses de foie fraîches ou sèches, figatelli), de sanglier ou de cerf (viande et abats).

** ou French kiss, exploration partagée et variée des lèvres, de la langue et de la bouche tout entière.

○ Pas de transmission ● Risque de transmission limité ● Risque de transmission élevé

Vaccins : vérifiez que vous êtes à jour pour vous-même et pour vos proches dont la santé est fragile (immunodéprimés).