

Elimination de l'hépatite C à l'horizon 2025, comment atteindre l'objectif dans les populations psychiatrique, pénitentiaire et migrante

Exemple à la maison d'arrêt de Villeneuve-Les-Maguelone

Dr MEROUEH Fadi

Dr BALLESTER Camille





Hépatites virales : les faits

- **400 millions** de personnes infectées dans le monde
- VHC **10 fois** plus contagieux que le VIH
- **25 %** des personnes infectées se sentent incapables d'en parler à leurs amis et à leur famille
- **80%** des décès par cancer du foie dus à une hépatite virale, soit **600 000** décès par an
4 000 morts par jour

Consommation de drogue dans les prisons européennes

Environ 860 000 personnes en prison en Europe

17 % sont en prison pour des délits liés à la drogue

► Dans les prisons européennes :

- Jusqu'à 60 % des personnes présentent une Addiction au moment de l'incarcération
- Jusqu'à 60 % de ceux qui s'injectent continuent de s'injecter pendant l'incarcération
- Jusqu'à 24 % des personnes détenues qui s'injectent des drogues déclarent avoir commencé en prison
- 70 % des UDI ont déclaré partager des seringues

► En France...

80 % des personnes détenues consomment du tabac

31% sont des consommatrices abusives d'alcool


10 % sont dépendantes à des drogues illicites

L'incarcération marque rarement l'arrêt des consommations : on observe un transfert des consommations

⇒ OFDT, Oppidum, Analyse des eaux usées


⇒ Notre clinique quotidienne

Le défi derrière les barreaux...



Retards dans

- Dépistage
- Diagnostic
- La gestion
- Traitement



Transmission communautaire
Décès du patient

Les avantages du traitement du VHC en milieu carcéral sont considérables



Prison

Réduit le risque de transmission du VHC
Améliore la santé des personnes détenues





La personne

Diminution du risque de cirrhose, d'insuffisance hépatique et de cancer du foie



Communauté

Diminution du risque de transmission du VHC après la libération



Constat accablant

Malgré des taux plus élevés de

- * Prévalence du VHC
- * Pratiques d'injections à risque parmi la population carcérale par rapport au grand public



L'accès à la prévention
et au traitement est
moindre

Le parcours de soins actuel



Simplifier la cascade de traitement



Simplifier la cascade de traitement

Dépister

- Test sur place
- Dépistage et confirmation en un : Demandez le **test ARN** en même temps que le test anticorps

Traiter

- Les **régimes pan-génotypiques** éliminent la nécessité de retarder le traitement en attendant la détermination du génotype et du stade de fibrose
- Utiliser des outils simples pour trier la cirrhose
 - APRI/FIB4, élastographie
- **Traitement simple** : une fois par jour, pendant 8 semaines, sans ribavirine, et sans suivi biologique pendant le traitement
- Abordable

Suivi

Tester et traiter à VLM : Model of care?

Etape 1 : Dépistage

Demander test ARN au moment du test d'anticorps (également test pour le VIH, le VHB, la syphilis, le chlamydiae...)

TSO
Accès à la réduction
risques
Naloxone

Etape 2 : Traitement

Pris une fois par jour, à l'US ou en cellule

Durée : 8 semaines

Etape 3 : Surveillance

Gestion du dépistage de la RVS

Traitement
complet à 90
% en
détention

Jour
1


Semaine
1 / 2

Semaine
2/3


Des tests sur buvard sont disponibles pour ceux qui ont une aversion pour les aiguilles ou les veines inappropriées

Remise du traitement si libération avant la fin des 8 semaines de traitement


70 à 80 % acceptent de se faire tester dont environ 95 % de notre population cible



La cascade de soins s'améliore, malgré le Covid 19



La guérison est possible en milieu carcéral



Réduction des risques à VLM

Coupling HCV treatment With addiction care at VLM



Information



Provision de préservatifs



Dépistage



HBV vaccination



Traitement Agoniste des Opiacés (TAO)
Continuité et initiation



HIV-HCV-HVB treatment



Dr Fadi Meroueh-De Médecin Généraliste VLM - CHRU Montpellier



Prophylaxie post Exposition

Accident Exposant au Sang (AES) ou à d'autres produits biologiques

Soins immédiats

Piqûre, coupure, contact sur peau lésée

- ne pas faire saigner,
- nettoyer immédiatement à l'eau et au savon,
- rincer,
- désinfecter pendant 10mn (par compresse ou trempage):
 - **ou DAKIN® stabilisé**
 - **ou à l'eau de Javel diluée à 0,5% chl** (1 berlingot de Javel pour 5L d'eau)

Projection sur l'oeil et les muqueuses

- rincer abondamment et immédiatement pendant 10 mn,
- ou sérum physiologique** ou à l'eau du réseau

Dans l'heure qui suit

Contactez immédiatement : (pour évaluer les risques de contamination VIH, Hépatite B et C...)

- Un médecin de votre service et/ou le service des Urgences
- Le Service de Santé au Travail de site pour renseignements complémentaires après 18h, les week-ends et jours fériés : contactez les Urgences

Vérifier le statut sérologique du patient source

- Si la sérologie VIH du patient source est positive**
Faire évaluer l'indication d'un traitement prophylactique préventif
- par un médecin des Maladies Infectieuses et Tropicales au 3 77 16 ou 3 23 83 (jours ouvrables)
- ou le médecin des Urgences au 3 81 72
- Si la sérologie VIH ou Hépatite C du patient source est inconnue et/ou si l'accidenté n'est pas protégé contre l'hépatite B**, après autorisation du patient, (hors cas particulier prévu par la réglementation en vigueur), effectuer en urgence un prélèvement sanguin sur le patient source (7 ml sur tube sec).
- Mettre le tube sec du patient source dans la pochette applicative - AREM 72
- Appeler immédiatement un coursier

Du lundi à vendredi de 8h00 à 18h00

- Faire une demande urgente dans «PIAH matière» et préciser dans «observations» qu'il s'agit d'un AES. Procédure valable 7/7 et 24/24h.
- Appeler le laboratoire de Virologie au : 3 83 37 ou 3 83 40 ou 3 83 95

Du lundi à vendredi après 18h00, week-end et jours fériés

- Appeler le 9 (standard) pour avoir l'aval du laboratoire de Virologie - Lapeyronie.
- Faire une demande PIAH comme ci-contre.

Dans tous les cas

- Contactez le Service de Santé au Travail : prendre rendez-vous pour une consultation afin d'analyser les circonstances, réaliser dans les 8 jours le prélèvement initial et planifier l'éventuel suivi.
Tél : Site LAP/ADV/COL : 3 95 36 - Site GDC/SI ELOI : 3 70 11
- Prendre contact avec votre bureau de gestion pour la déclaration obligatoire d'Accident de Travail (AT).

Feuille de déclaration d'Accident de Travail pour les titulaires

Feuille de déclaration d'Accident de Travail pour les médecins et les personnes non titulaires

Document réalisé en collaboration avec le CLIN, la Virologie Lapeyronie, les Urgences, les Maladies Infectieuses et Tropicales et le Service de Santé au Travail - Juin 2018
Service Communication - CHU de Montpellier - 15 AOUT 2018

250 ml à 9,6 % + **750 ml d'eau** = **1 litre à 2,6 % chl**

100 ml d'eau de Javel à 2,6 % chl + **400 ml d'eau froide** = **eau de Javel à 0,5 % chl**

Contenant de 500 ml

Contact : 5 mn minimum

Enveloppe AES

Cette enveloppe ne doit contenir que le tube du patient source

Feuille de déclaration d'Accident de Travail pour les médecins et les personnes non titulaires

Feuille de déclaration d'Accident de Travail pour les titulaires

DECLARATION ACCIDENT DE TRAVAIL ACCIDENT DE TRAJET MALADIE PROFESSIONNELLE RECHUTE

NOM PRENOM
GRADE
ETABLISSEMENT
DATE DE L'ACCIDENT

Document réalisé en collaboration avec le CLIN, la Virologie Lapeyronie, les Urgences, les Maladies Infectieuses et Tropicales et la Médecine du Travail - Avril 2011

Emtricitabine/Tenofovir Mylan® - EDURANT® 25 mg®

Soins d'entretien

Emtricitabine/Tenofovir Mylan®
- Les substances actives sont : **Emtricitabine (200 mg)** et **Tenofovir disoproxil (245 mg)**.
- C'est un inhibiteur non nucléosidique de la transcription inverse du VIH (Virus de l'immunodéficience Humaine) avant son entrée dans le noyau de nos cellules.

EDURANT®
- Les substances actives sont : **Régulhydrate (25 mg)**.
- C'est un inhibiteur non nucléosidique de la transcription inverse du VIH empêchant l'insertion de l'ADN viral dans l'ADN de la cellule infectée.

L'objectif est que cette association et dans quel cas l'utiliser ?
- Elle se présente sous la forme de comprimés :

Emtricitabine/Tenofovir Mylan®

Edurant®

- Ils sont indiqués dans le cadre des accidents d'exposition au VIH afin de limiter les risques de contamination par celui-ci. Le traitement doit être **généralement dans les 4 heures** suivant l'exposition et jusqu'à 48 heures après, et se poursuivre pendant 4 semaines. Ces médicaments sont disponibles en pharmacie de ville et d'hôpital.

2- Quels sont les informations nécessaires avant de prescrire cette association ?

⚠ **Ne pas prendre Emtricitabine/Tenofovir Mylan® :**

- En cas d'allergie au principe actif ou à l'un des constituants.
- En cas d'insuffisance rénale sévère.

⚠ **Ne pas prendre Edurant® :**

- En cas d'allergie au principe actif ou à l'un des constituants.

EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET MISES EN GARDE SPECIALES :

- Pour une meilleure absorption de l'Edurant® celui-ci sera pris au cours d'un repas
- Ne pas prendre d'inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) : Mopral, Ixium, pendant le traitement
- Indiquez à votre médecin et votre pharmacien tous les traitements que vous prenez, avec ou sans ordonnance, y compris les extraits à base de plantes car de nombreux médicaments peuvent augmenter le risque de survenue d'effets indésirables et réduire l'efficacité de votre traitement.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

JOUR 4
1 comprimé Emtricitabine/Tenofovir Mylan® 200 mg/245 mg
+
1 comprimé EDURANT® 25 mg

JOUR 3
1 comprimé Emtricitabine/Tenofovir Mylan® 200 mg/245 mg
+
1 comprimé EDURANT® 25 mg

JOUR 2
1 comprimé Emtricitabine/Tenofovir Mylan® 200 mg/245 mg
+
1 comprimé EDURANT® 25 mg

JOUR 1
1 comprimé Emtricitabine/Tenofovir Mylan® 200 mg/245 mg
+
1 comprimé EDURANT® 25 mg

➤ Hygiène et coiffure



➤ Substituts nicotiques



Roule ta paille, pipe à crack, aluminum « chasser le dragon »



Prévention:
Groupe de parole
Atelier
Expression
Corporelle



PES



Implementation of Naloxone take home





MERCI DE VOTRE ATTENTION

