

23E
FORUM
NATIONAL
2022

24 ET 25 NOVEMBRE, ANGERS

PRÉVENIR, DÉPISTER, GUÉRIR :
NE LAISSONS PLUS LES PERSONNES
MALADES DU FOIE MOURIR EN SILENCE !




NASHLETTER

La Newsletter de SOS Hépatites destinée aux personnes concernées par la NASH - Pour s'abonner, envoyer un email à secretariat@soshepatites.org

Inscrivez-vous sur notre groupe Facebook :  « NASH ou hépatite métabolique »

N° Vert 0 800 004 372

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE OU UN MOBILE



Pour recevoir chaque mois cette newsletter, envoyez un email à :
nashletter@soshepatites.org



La NASHLETTER a été créée il y a 18 mois

Au départ, il s'agissait d'évoquer essentiellement stéatose et NASH, mais ...

- Conjonction de plusieurs facteurs est exponentielle (virus, alcool, NASH...)
- Plus on cumule, plus on risque d'atteindre une maladie hépatique grave
- Évaluer les facteurs de risques pour éviter cirrhose et cancer



Concrètement, la NASHLETTER traite de plus en plus souvent de sujets qui lui sont souvent associés, soit :

- Le diabète
- Le surpoids

Mais aussi

- L'alcool avec les NASH « arrosées » et aussi le mésusage suite à une chirurgie bariatrique

23E
FORUM
NATIONAL
2022

24 ET 25 NOVEMBRE, ANGERS

PRÉVENIR, DÉPISTER, GUÉRIR :
NE LAISSONS PLUS LES PERSONNES
MALADES DU FOIE MOURIR EN SILENCE !



Chirurgie bariatrique puis hépatite alcoolique sévère : une séquence de plus en plus fréquente ...

- Objectif : étudier l'association entre chirurgie bariatrique et développement d'une hépatite alcoolique aiguë sévère (HAS)
- Etude rétrospective monocentrique


Devenir des patients

	Groupe chirurgie bariatrique (n = 28)	Pas de chirurgie (n = 130)	p
Réponse aux corticoïdes	14/19 (73,7 %)	56/130 (65,9 %)	p = 0,60
Survie à 28 jours	27 (96,4 %)	118 (90,8 %)	p = 0,47
Survie à 3 mois	24 (85,7 %)	90 (69,8 %)	p = 0,10
Survie à 1 an	13 (54,2 %)	67 (54,5 %)	p = 1,00

Paramètres associés à la survie à 3 mois

	Analyse univariée	P	Analyse multivariée	p
Age	0,99 (0,98-0,99)	< 0,001	0,98 (0,98-0,99)	< 0,001
Chirurgie bariatrique	1,15 (0,96-1,38)	0,10	1,04 (0,88-1,23)	0,623
Maddrey	0,99 (0,99-0,99)	< 0,001		
MELD	0,98 (0,97-0,99)	< 0,001	0,98 (0,97-0,98)	< 0,001

Proportion des patients aux ATCD de chirurgie bariatrique parmi les patients avec HAS



- La proportion de patients ayant un ATCD de chirurgie bariatrique augmente au fur et à mesure des années parmi les patients présentant une hépatite alcoolique sévère
- Le mésusage lié à l'alcool doit être prévenu chez ces patients




L'addiction est donc parfois dans la boucle de la NASH avec les consommations d'alcool
Et aussi les TCA, l'addiction au sucre donc

23E
FORUM
NATIONAL
2022

24 ET 25 NOVEMBRE, ANGERS
PRÉVENIR, DÉPISTER, GUÉRIR :
NE LAISSONS PLUS LES PERSONNES
MALADES DU FOIE MOURIR EN SILENCE !

sos hépatites
Fédération
Hépatites & Maladies du foie



VICE VERSA

la première newsletter

HEP 'ADDICT

Pour s'abonner, envoyez un mail à :
newsletterviceversa@gmail.com